

Una intervención peligrosa José Mota

Verá, José Luis, no me quiero **andar con rodeos**. La intervención que se le va a realizar es muy peligrosa, quiero que lo sepa. Es una operación complicada, son 15 horas de intervención, al corazón abierto, y bueno, puede que no salga con vida del quirófano. De hecho, el margen de supervivencia que hay en este tipo de intervenciones no supera el 1%.

¿Y no existe otro tratamiento?

Bueno, se le podría realizar una operación en vez de 15 horas, de una hora, pero el margen de supervivencia no sería del 1%. Sería del 10%.

Ya. No sé si no hay más posibilidades.

Hemos estudiado también la posibilidad de, bueno, realizarle un cateterismo, que es menos agresivo y no tendríamos que operarle. Pero claro, ya no tendríamos ese 10% de margen de supervivencia. Estaríamos ahora moviéndonos en un 40% de éxito.

No sé si usted no ve más opciones, doctor.

Hemos estudiado incluso el procederle unas inyecciones de aplicación cutánea en el muslo, pero el margen de supervivencia es del 70%.

¿Y no hay otra salida?

Me temo que no, José Luis. **A no ser que** se tome usted un jarabe de esos abiertos que tenga usted en casa, en cuyo caso el margen de supervivencia no sería del 70%. Sería del 100%.

100%. Creo que voy a optar por el jarabe.

¿Ha perdido usted la cabeza? ¿Me está usted diciendo que prefiere un jarabe a una intervención a corazón abierto?

Me voy a arriesgar.

Es su vida. Es su vida. Los pacientes ya no saben lo que quieren.